

<生ワクチンと不活化ワクチンの違い>

	生ワクチン	不活化ワクチン
接種回数	1回	2回（1回目の接種後 2～6か月後までに2回目接種）
带状疱疹発症予防効果	50歳代で69.8%	50歳以上で96.6%
効果持続	5年程度	9年以上
副反応	<p>【頻度10%以上】 発赤(44.0%)、掻痒感(27.4%)、熱感(18.5%)、腫脹(17.0%)、疼痛(14.7%)、硬結(13.5%)</p> <p>【重大な副反応】※頻度不明 アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎</p>	<p>【頻度10%以上】 疼痛(79.1%)、発赤(37.4%)、腫脹(24.2%)、胃腸症状(12.0%)、頭痛(28.3%)、筋肉痛(36.9%)、疲労(34.6%)、悪寒(21.4%)、発熱(16.7%)</p> <p>【重大な副反応】※頻度不明 ショック、アナフィラキシー</p>
助成額	4,000円	1回につき、10,000円
助成回数	1回	2回まで
接種費用 ※接種費用は医療機関 によって異なります	8,000～10,000円程度 (自己負担4,000～6,000円程度)	1回20,000～25,000円程度 (自己負担10,000～15,000円程度)
その他注意事項	明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方及び免疫抑制をきたす治療を受けている方、妊娠していることが明らかの方は生ワクチンの接種は受けられません。	